







TABELLA RIASSUNTIVA

Specie /famiglia	Insetto (mm)	Foro di sfarfallamento (mm)/forma	Ciclo biologico (anni)		Specie legnosa <i>Condizioni favorevoli</i>
Anobiidi					
Anobius punctatum "Tarlo dei mobili"	2,5-5	1-2 / tondo	1/2 (in condiz. particolari) – 2		Conifere e latifoglie (alburno e durame) <i>Umidità</i>
Xestobium rufovillosum "orologio della morte", grande tarlo	5-7	2-3/ tondo	2-4		Quercia castagno, faggio, noce, olmo, ontano, salice, pioppo. <i>Umidità, presenza di funghi saprofiti</i>
Lictidi Lyctus brunneus	3-5	1-1,5/ tondo	1-2		Quercia, acero, noce e frassino
Cerambicidi Hylotrupes bajulus "Capricorno delle case"	17-25	4-6 x 8-10/ ovale sfrangiato	1-8		Soprattutto conifere
		popolazione	sciamatura		
Termiti (formiche bianche) Kaloterмес flavicollis "Termite dal color giallo"(operaio)	10-12 (4-5)	1000-2000	Luglio-ottobre		<i>Are calde e temperate, anche in ambienti secchi</i>
Reticulitermes lucifugus "Termite lucifuga"(operaio)	10-12 (4-5)	Decine di migliaia	Primavera-estate		<i>Are calde e temperate, in presenza di un alto tasso di umidità</i>